



Journal de la Clinique

Clinique Vétérinaire
du VIC-BILH

Été 2013

Les coulisses de la clinique

Analyses ultra-rapides

Nous venons d'acquérir un appareil ionogramme qui réalise des analyses rapides à la clinique dans les cas de réanimation ou de suivi de syndrome urinaire, digestif et endocrinien.

Anesthésie... pour un oeuf

Une nouvelle cage d'anesthésie nous permet maintenant de réaliser des interventions chirurgicales sur les petits animaux de compagnie (oiseaux, NAC...). Dernièrement, elle nous a permis de retirer un œuf coincé dans l'oviducte d'une perruche.

Formation continue

Les assistantes vétérinaires - Alexandra, Christelle et Justine - ont toutes suivi une formation de parasitologie axée sur l'émergence de nouveaux parasites dans nos régions.

Horaires d'ouverture

Lundi - vendredi : 8h30-12h et 14h-19h

Samedi : 8h30-12h00 et 14h00-17h00

Consultations sur rendez-vous

05 59 77 49 34

87 rue Joseph Peyré
64350 LEMBEYE
scp.ircadu@orange.fr



L'été est certes une saison agréable, mais recèle de dangers insoupçonnés.

Les coups de chaleur : ne laissez jamais votre chien dans la voiture ou dans une véranda, même à l'ombre ou lorsque le soleil est voilé. La température dans ces endroits peut grimper de façon exponentielle, entraînant une augmentation de la température corporelle qui



peut vite être fatale à votre compagnon.

Les gestes qui sauvent : placez-le à l'ombre dans un endroit aéré et **refroidissez-le progressivement** avec des linges mouillés sur le corps, en commençant par la région du cou. C'est là que se trouvent les centres de la thermorégulation et les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Mouillez ensuite progressivement tout le reste du corps, puis enveloppez-le dans un drap de bain préalablement mouillé à l'eau fraîche, le temps de le transporter chez le vétérinaire le plus proche.

Les coups de soleil : mettez de l'écran total sur les oreilles et le bout du nez de votre chat si ces parties du corps sont blanches. Cela évitera qu'il n'attrape des coups de soleil, qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer de la peau.

Puces : redoublez de vigilance et traitez vos animaux régulièrement,

Les dangers de l'été

car les puces prolifèrent vite en été et provoquent parfois des allergies très désagréables pour votre compagnon.

Les épillets se fauflent partout : dans les oreilles, entre les phalanges, sous les paupières et parfois dans des endroits encore plus farfelus tels que la bouche, le nez ou les parties génitales. Afin



de limiter les risques, inspectez bien votre chien après chaque promenade et faites le toiletter bien court pour la période estivale. Consultez-nous rapidement si vous trouvez le point d'entrée d'un épillet sur la peau ou si votre compagnon se secoue les oreilles violemment.

Pourquoi faire stériliser votre chienne

La contraception médicale, une bonne solution ?


Non, la contraception par piqûres ou par comprimés n'est pas la solution optimale. Elle n'aura aucun effet sur les autres problèmes hormonaux et elle peut précipiter certaines maladies, telles que les infections utérines.

La stérilisation chirurgicale présente de nombreux avantages. C'est la meilleure solution pour éviter à votre animal de nombreux problèmes de santé, entre autres les tumeurs mammaires, le pyomètre et les grossesses nerveuses. Cette opération a pour but l'ablation des ovaires, avec ou sans l'utérus. L'idéal est de faire opérer sa chienne avant sa puberté dès l'âge de 6 mois.

Les **tumeurs mammaires** sont très fréquentes chez la chienne. Elles sont cancéreuses dans un cas sur deux. L'apparition d'une tumeur est évitée à 99,5% par une stérilisation chirurgicale avant la puberté (c'est-à-dire avant les premières chaleurs) et à 90% avant ses deuxièmes chaleurs.

Le **pyomètre** est une affection très grave caractérisée par l'accumulation de pus dans l'utérus. Cette maladie se traite par l'ablation de l'utérus et des ovaires. Si le pyomètre est diagnostiqué tardivement, la chienne risque une péritonite extrêmement grave, ainsi qu'une insuffisance rénale.

La **grossesse nerveuse** se caractérise par un changement du comportement de votre animal, environ deux mois après ses chaleurs. La chienne agit comme si elle avait des petits : comportement agressif, montées de lait et troubles alimentaires. Sachez enfin qu'une chienne stérilisée a tendance à vivre plus longtemps, car elle a moins de problèmes de santé.



L'anesthésie générale - Le Dr Candelli vous éclaire



Le Dr Candelli et l'ASV Alexandra en chirurgie devant l'appareil d'anesthésie gazeuse

Sans doute vous êtes-vous souvent demandé comment se passe exactement l'anesthésie d'un animal de compagnie. De nombreuses procédures en médecine vétérinaire nécessitent qu'un animal soit endormi, soit parce qu'elles sont douloureuses, soit parce qu'elles nécessitent une immobilité parfaite.

La première étape d'une anesthésie générale consiste en l'administration d'un médicament pour tranquilliser votre compagnon et diminuer son anxiété, ainsi que la pose d'un cathéter dans la veine d'une de ses pattes. Ensuite, l'animal est endormi : c'est l'anesthésie générale proprement dite. Un agent anesthésique est injecté par voie intra-veineuse. Cette « induction » de l'anesthésie entraîne l'endormissement de votre animal en moins d'une minute.

Lors d'interventions plus longues, une sonde est introduite dans la trachée afin de lui administrer un mélange d'oxygène et de gaz anesthésique, ce qui permet de prolonger l'anesthésie en toute sécurité, même pour des animaux très vieux. Un équipement de monitoring permet de surveiller les fonctions vitales pendant la durée de l'intervention.

Même conduite avec compétence et dans le respect des procédures scientifiques éprouvées, l'anesthésie comporte un risque, tout comme pour l'homme.

Nos **protocoles anesthésiques** sont **personnalisés** : nous les adaptons en fonction de l'état de santé et de l'âge de votre animal. Nous vous conseillons également de réaliser un **bilan sanguin**, qui permettra de mettre en évidence des pathologies qui pourraient compliquer l'anesthésie.

Animal vacciné = animal protégé

Tout au long de sa vie, votre compagnon peut attraper des **maladies contagieuses** pouvant affecter gravement sa santé, voire même être fatales. Certaines de ces maladies sont également transmissibles à l'homme, comme c'est le cas de la leptospirose et de la rage.

Pour prévenir ces affections graves, la vaccination est la seule vraie protection.

Les **primo-vaccinations** interviennent très tôt dans la vie de l'animal. En effet, vers l'âge de 2 mois, les chiots et les chatons ne sont plus protégés par les anticorps de leur mère et de ce fait, ils sont particulièrement exposés aux maladies. C'est donc à cet âge qu'il convient de procéder à la première injection, suivie d'un premier rappel un mois plus tard.

Par la suite, sachez que la majorité des vaccins exigent un **rappel annuel**. De plus, les défenses immunitaires de votre ami à quatre pattes baissent avec l'âge. Ne négligez donc pas ses vaccins même s'il est vieux ! Une vaccination régulière nous permet également d'examiner votre protégé sous toutes ses coutures et de déceler précocement d'éventuels problèmes de santé.

De nombreux vaccins sont disponibles pour les animaux de compagnie. Certains d'entre eux ne sont pas systématiquement administrés. N'hésitez donc pas à nous questionner à ce sujet afin que nous puissions vous conseiller le protocole le plus adapté.



Nettoyage des oreilles : comment s'y prendre ?



1
Soulever le pavillon auriculaire



2
Verser la lotion dans le conduit



3
Masser à la base de l'oreille 30 sec



4
Essuyer l'excédent de produit et les impuretés

Limitez l'emploi du coton-tige à la partie externe de l'oreille. Uniquement. Ne l'employez pas pour le conduit auditif, car il pourrait repousser toutes les impuretés au fond.

Utilisez un produit spécifique pour chien sous forme de **lotion auriculaire**. Elle présente en général un embout souple que l'on introduit délicatement dans l'oreille.

② Exercez une légère pression sur la lotion en la tenant à la verticale. Puis massez l'oreille à sa base ③ pour faire pénétrer le produit et dissoudre les impuretés localisées au fond du conduit. Essayez finalement l'excédent de produit et les impuretés avec du coton. ④