



# Le Journal de la Clinique

Automne 2016

## Clinique Vétérinaire du VIC-BILH

05 59 77 49 34

87 rue Joseph Peyré - 64350 LEMBEYE  
Consultations sur RDV : lun-ven 8h30-12h et 14h-19h, samedi 8h30-12h et 14h-17h

### Bienvenue à Camille BOLILLO

Une nouvelle vétérinaire vient rejoindre notre équipe en remplacement du Dr Liz DECLERCK actuellement en congés maternité.

Le Dr Bolillo avait déjà effectué 1 an de stage au sein de la clinique du Vic-Bilh, puis elle a passé 1 an dans une clinique aveyronnaise. La Clinique du Vic-Bilh est très heureuse de l'accueillir pour son retour sur sa terre natale, ses compétences renforceront notre équipe.



### NOUVEAU À LA CLINIQUE traitement des puces et des tiques chez le chat

Sortie d'un produit révolutionnaire : ce nouveau spot on (pipette) promet **12 semaines de protection** !

Les puces comme les tiques peuvent véhiculer des maladies vectorielles (l'hépatite bartonelle et la maladie de Lyme en sont deux exemples). Les puces sont également responsables de dermatites allergiques parfois très importantes chez le chat, ainsi que de la transmission de vers plats.

Le manque de régularité des traitements est souvent à l'origine d'un échec thérapeutique. Un traitement toutes les 12 semaines sera certainement plus pratique. Fini, les oublis !

## L'arthrose : une maladie invalidante peu reconnue

### Le saviez-vous ?

L'arthrose atteint 1 chien sur 5 de plus d'un an et reste sous-diagnostiquée. Elle est la pathologie de l'appareil locomoteur la plus fréquente chez le chien.

### De quoi s'agit-il ?

L'arthrose est une maladie chronique dégénérative se caractérisant par la dégradation du cartilage qui entoure l'extrémité des os. Avec le temps et sous les contraintes mécaniques, le cartilage s'abîme et s'effrite. L'articulation subit alors des

réactions inflammatoires très douloureuses pour le chien ou le chat.

Le système immunitaire de l'animal est ensuite sollicité, des globules blancs venant phagocyter les fragments de cartilage responsables de la douleur. Malheureusement la libération d'enzymes par ces derniers entretient l'inflammation, qui devient chronique.


La douleur peut ensuite survenir par crises ou à l'inverse, être présente en permanence.

### Comment la soigner ?

Vous pouvez significativement améliorer la qualité de vie de votre compagnon

par différents moyens :

- Veillez à ne pas laisser grossir votre animal ou faites-lui perdre ses kilos de trop.
- Complémentez son alimentation en glucosamine et en chondroïtine, il existe même des aliments déjà enrichis en ces éléments.
- L'hydrothérapie et l'ostéopathie.
- Les anti-inflammatoires sont souvent nécessaires pour limiter la douleur et favoriser la mobilité de nos chiens arthrosiques. Des comprimés à libération prolongée (1 prise par mois) peuvent être prescrits.



### Reconnaître la douleur

- Raideur au réveil
- Difficultés à se lever, se coucher ou monter les escaliers
- Boiterie
- Un chien moins intéressé par les jeux
- Des réactions lors de manipulations

Notez qu'il est rare que le chien manifeste sa douleur en se plaignant, ne sous-estimez pas son inconfort ! S'il manifeste un des signes ci-dessus, la douleur est bien présente.





## Savoir reconnaître un chien stressé

Apprenez à écouter votre compagnon et à identifier les signes de stress :

- **Aboiements** : peuvent être dûs au confinement, à un manque d'exercice ou à la frustration.
- **Tremblements, agitation** : lors de voyages, séjours en pension, feux d'artifice.
- **Hypersalivation** : en l'absence d'une cause physique (douleur ou en attente de nourriture), elle peut être liée au stress.
- Le chien **se cache** : lorsque le chien fuit une situation stressante.
- **Léchage excessif** : il peut être dû au stress en l'absence de causes physiques (allergies p.ex.).

### Comment remédier à la situation

- Ne soyez pas vous-même inquiet – vous transmettez ce sentiment à votre chien !
- Comportez-vous normalement et n'essayez pas de le rassurer en le caressant, vous ne ferez que renforcer son inquiétude.
- Socialisez bien votre jeune chien, cela lui évitera de devenir un chien anxieux – cette socialisation se fait en particulier entre 8 et 16 semaines.
- Ne punissez surtout pas votre animal.
- Évitez les situations qui peuvent être stressantes.
- Pensez aux phéromones apaisantes (Adaptil®) : elles existent en diffuseur, collier à libération prolongée et sous forme de comprimés.

Adaptil® est une reproduction de la phéromone maternelle produite par la chienne en période d'allaitement pour rassurer les chiots.

De nos jours, avec notre style de vie mouvementé, les habitudes de nos chiens sont parfois rudement chamboulées, provoquant chez certains individus un stress qu'il ne faut pas négliger. Qu'il s'agisse d'un déménagement, de bruits forts (orages, feux d'artifice), d'un séjour en pension, d'un voyage, il existe des traitements efficaces qui apaiseront votre compagnon.

**DICO-ANIMO**



pour KONG

Cette marque propose des jouets pour chien super-résistants et fourrables.



pour LEPTOSPIROSE

La leptospirose est une maladie bactérienne principalement transmise par l'urine de rat, qui peut être contractée par l'homme. Elle se traduit par une forte fièvre et une insuffisance rénale et hépatique. Elle est fatale si elle n'est pas traitée précocement.

## Zoom sur l'anorexie du chat

Ne dit-on pas « *bon appétit égal bonne santé !* » Chez le chat, une diminution ou une perte d'appétit peut être le symptôme d'une maladie sous-jacente et ne doit pas être prise à la légère.

### A quoi reconnaît-on l'anorexie ?

Lorsqu'elle arrive brutalement, elle est aisément détectée et entraîne rapidement une consultation. C'est le cas par exemple des gingivo-stomatites (inflammation de la bouche et des gencives). Mais il arrive qu'elle s'installe très progressivement (chez les chats senior en particulier). Dans ces cas, votre compagnon peut devenir de plus en plus « difficile », refusant certaines nour-

ritures. Ce comportement doit vous alerter s'il s'accompagne de fatigue ou d'un amaigrissement.

### Les causes

Le chat est un animal très sensible, réagissant parfois à des changements d'habitude tels qu'un changement d'alimentation trop brutal, un déménagement, un nouveau chat dans le voisinage etc... Ces changements perturbent parfois l'appétit de nos petits félins.

L'anorexie peut être attribuée à une douleur dans la bouche ou un manque d'odorat (p.ex. lors d'un coryza). De nombreuses autres maladies peuvent provoquer l'anorexie : la fièvre, la douleur, les maladies rénales ou hépatiques, les gastro-entérites, la pancréatite, les cancers. D'autres symptômes permettent dans ces cas-là de diriger le diagnostic vers une affection ou une autre.

### Les conséquences de l'anorexie et son traitement

Une anorexie de 4-5 jours entraîne chez le



chat une **lipidose hépatique**. La mobilisation trop rapide des réserves lipidiques (en particulier chez les chats obèses) entraîne une surcharge graisseuse du foie, qui peut être fatale au chat. Il est impératif de **renourrir rapidement** ces animaux, en particulier les chats en surpoids.

Cette réalimentation peut être effectuée de manière différente et nécessite une hospitalisation : administration à la seringue d'aliments de soutien sous forme semi-liquide, pose d'une sonde naso-oesophagienne ou oesophagostomie. La cause de l'anorexie doit être identifiée rapidement, car le but est que le chat se réalimente de lui-même dès que possible.

## La balance : un outil indispensable !

A la clinique, nous enregistrons le poids de votre chat à chacun de ses passages. Cela a pour but de déceler une éventuelle perte de poids pouvant être attribuée à une anorexie. Car n'oubliez pas qu'un chat qui ne mange pas chez vous, peut très bien manger chez le voisin !